



Delivery : Normal / Vacuum / Forceps / Caesarean

Neonatal Status :

Birth Weight : Length : Head Circumference : Blood Group : AB+

Remarks :

Vaccination Chart

Age	Preventive vaccine	Due Date to be taken	Date of vaccination	Batch	Weight	Length
Birth	BCG		29.10.2015			
	OPV O (Polio drops)		29.10.2015			
	Jaundice B 1		29.10.2015			
6 Weeks (One and half months)	Triple first	5.12.2015	5.12.2015		4.570 kg	
	Jaundice B 2	5.12.2015	5.12.2015			
	Brain Fever/Encephalitis	5.12.2015	5.12.2015			
	IPV 1 (Injection of Polio)	5.12.2015	5.12.2015			
	Rota Virus	5.12.2015	5.12.2015			
	*PCV 1	5.12.2015	5.12.2015			
10 Weeks (Two and half months)	Triple second	5.1.2016	5.1.2016		5.590 kg	
	Brain Fever/Encephalitis 2	5.1.2016	5.1.2016			
	IPV 2 (Injection of Polio)	5.1.2016	5.1.2016			
	Rota Virus 2	5.1.2016	5.1.2016			
	*PCV 2	5.1.2016	5.1.2016			
14 Weeks (Three and half months)	Triple third	5.2.2016	9.2.2016		6.2 kg	
	Brain Fever/Encephalitis 3	5.2.2016	9.2.2016			
	IPV 3 (Injection of Polio)	5.2.2016	9.2.2016			
	Rota Virus 3					
	*PCV 3			4.3.2016		
6 Months	OPV O (Polio drops)			4.3.2016		
	Jaundice B 3			19.3.2016		
	*Swine Flu					
7 to 14 Months	OPV O 2 (Polio drops)					
	Measles		26.10.2016			
	Typhoid		5.11.2016			
	Jaundice A 1		23.11.2016			
15 Months	MMR 1				9.2 kg	
	*Chicken Pox		14.11.2016			
16 to 18 Months	Triple Third Booster 1			1.11.2017		
	Brain Fever Booster 1			1.11.2017		
	IPV B 1 (Injection of Polio)			1.11.2017		
	*PCV Booster			1.11.2017		

For Yashvi Translation



ATTESTED
Mehhar Chand Paul
Advocate, Notary
Registration NO. 13416



	* Typhoid			1.11.2017		
18 Months	Jaundice A 2					
2 Years	* Typhoid (If oral Typhoid vaccine is not given)					
4 to 5 Years	Triple Third Booster 2					
	OPV 0 3 (Polio drops)					
	MMR 2					
	*Chicken Pox 2					
	* Typhoid					
10 to 12 Years	T DAP/TD					
	*H P V (Only for girls)					

(Note : *Marked vaccines are optional.)

Care to be taken after vaccination.

1. No special care is required after administering BCG vaccine. After four to six weeks, a small pustule forms at the site, pus forms and scabs over, and it heals on its own.
2. Children are likely to have a fever for the first two days after receiving the triple injection. The injection site may swell and cause pain the leg. In such a case cold water strips should be placed on the injection site. Do not make the injection site warm.
3. There is usually no harm after a polio dose. Possibility of diarrhea in children is rare. Children should be given ORS water in such cases.
4. 3 to 4 days after the measles vaccine, the baby may rarely develop a slight cold, fever and rashes on the body. This mild discomfort can last for 3 to 4 days.
5. If the fever is high, consult a doctor immediately.

For Yashvi Translation

(Handwritten signature)



ATTESTED

Mehar Chand Paul
Advocate, Notary
Registration NO. 13416

0, 1, 6, 1 1/2, 2 1/2, 3 1/2

Delivery : Normal / Vacuum / Forceps / Caesarean

Neonatal Status :

Birth Weight : Length : Head Circumference : Blood Group : AB⁺

Remarks :

APL
HIV
HCV

लसीकरण तक्ता

वय	प्रतिबंधक लस	ध्यावयाची तारीख	दिल्याची तारीख	बॅच	वजन	लांबी
जन्म	बीसीजी ओपीव्ही ओ (पोलीओ ड्रॉप्स) कावीळ ब १		११/१०/१५			
६ आठवडे (दिड महिने)	ट्रिपल पहिला कावीळ ब २ मेंदु ज्वर १ आयपीव्ही १ (पोलीओ चे इंजेक्शन) रोटा वायरस * पीसीव्ही १		१५/१२/१५	ComBE Five (DTP+HepB+Hib) Batch No. 12021114 Expiry Date: 04/2018 B.No. 060204-3 MFG. AUG. 2013 EXP. JUL. 2018 POLIOVAC ROTAVAC Batch No. 61FA15011 Mfg. Date: 07/15 Exp. Date: 06/20	4.57kg	
	१० आठवडे (आडीच महिने)		१५/११/१६	ComBE Five (DTP+HepB+Hib) Batch No. 20020115A Expiry Date: 04/2017 ROTAVAC Batch No. 61FA15014 Mfg. Date: 03/15 Exp. Date: 02/20	5.90	
	१४ आठवडे (साडेतीन महिने)	ट्रिपल तिसरा मेंदु ज्वर ३ आयपीव्ही ३ (पोलीओ चे इंजेक्शन) रोटा वायरस ३ * पीसीव्ही ३		११/१२/१६	ComBE Five (DTP+HepB+Hib) Batch No. 20020115A Expiry Date: 04/2017 ROTAVAC Batch No. 61FA15014 Mfg. Date: 03/15 Exp. Date: 02/20	6.2kg
६ महिने	ओपीव्ही ओ (पोलीओ ड्रॉप्स) कावीळ ब ३ * स्वाईन फ्ल्यु		१३/११/१६	43/16 19/3/16		
	ओपीव्ही ओ २ (पोलीओ ड्रॉप्स) गोवर		२६/१०/१६	Sum.		
१५ महिने	एमएमआर १ * कांजण्या १		२३/११/१६			
	ट्रिपल तिसरा बुस्टर १ मेंदु ज्वर बुस्टर १ आयपीव्ही बी १ (पोलीओ चे इंजेक्शन) * पीसीव्ही बुस्टर * टायफॉइड		१४/११/१६			9.2kg
१६ ते १८ महिने	Quadrax (Polysaccharide Conjugate Vaccine (adsorbed) Ph. Eur. Synflorix®) Batch No. 12021114 Mfg. Date: 07/15 Expiry Date: 06/20 XSPNA892A1 10/15 05/18 1499.00 QUADROVAX		११/१२/१६			
१८ महिने	* कावीळ अ २ * टायफॉइड (वॉरल टायफॉइड लस दिलेली नसल्यास)					
२ वर्षे	ट्रिपल तिसरा बुस्टर २ ओपीव्ही ओ ३ (पोलीओ ड्रॉप्स) एमएमआर २ * कांजण्या २ * टायफॉइड					
४ ते ५ वर्षे	टी डीएपी/टीडी * एच पी व्ही (फक्त मुलींसाठी)					

HAV
Typhoid




INACTIVATED INFLUENZA VACCINE (SPLIT VIRION) VAXIGRIP 0.25ml Manufactured by: Sanofi Pasteur
Parc Industriel d'Ince BP 101, 27100 Val de Reuil, FRANCE
Import Lic No. SV-5-42
Imported, Re-stickered
Marketed in India by: Sanofi Pasteur India Pvt.
L-223, TTC, Industrial Area Mahape, New Mumbai - 400710
Mfg Lic No. KD/6
Max. Retail Price Rs. 670.00 (Inclusive of All Taxes)
Mfg. Date : 26 May 2015
Lot No. M7208.2

BIOVAC™ - A
B.No. 20160307-2
Date of infusion:



AS9FE030A
06-2015
05-2017



(टिप : * केलेल्या लसी ऐच्छीक आहे.)

लस दिल्यानंतर ध्यावयाची काळजी

- बी.सी.जी. लस दिल्यानंतर विशेष काळजीची गरज नसते. चार ते सहा आठवड्यांनी त्या ठिकाणी छोटी पुळी येते, त्यात पु होऊन खपली धरते व ते आपोआप बरे होते.
- ट्रिपल इंजेक्शन दिल्यानंतर मुलांना पहिले दोन दिवस ताप येण्याची शक्यता असते. इंजेक्शन दिलेली जागा सुजून पायदुखण्याची शक्यता असते अशा वेळी इंजेक्शन दिलेल्या जागेवर थंड पाण्याच्या पट्या ठेवाव्यात, इंजेक्शनची जागा शेकू नये.
- पोलीओ डोस दिल्यानंतर सहसा काहीज त्रास होत नाही आपवादानेच मुलांना जुलाब होण्याची शक्यता असते त्यासाठी मुलांना ओआरएस चे पाणी पाजावे.
- गोवर लस दिल्यानंतर ३ ते ४ दिवसांनी बाळाला क्वचित थोडी सर्दी, ताप व अंगावर पुरळ येण्याची शक्यता असते. या सौम्य स्वरूपातील त्रास ३ ते ४ दिवस राहू शकतो.
- ताप जास्त असल्यास त्वरीत डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.